# pBluescript SK(-)

| | |
|---|---|
| **载体编号 Vector ID** | V011754 |
| **抗性 Antibiotic Resistance** | Ampicillin |
| **长度 Length** | 2958 bp |
| **载体类型 Vector Type** | I.M.A.G.E. Consortium Plasmids |

## 产品信息

| | |
|---|---|
| **复制子 Replication Origin** | ori |
| **来源 Source/Author** | Short JM, Fernandez JM, Sorge JA, Huse WD. |
| **拷贝数 Copy Number** | High copy number |
| **5' 引物 5' Primer** | M13 fwd |
| **3' 引物 3' Primer** | M13 rev |
| **培养菌株 Growth Strain(s)** | Top10 |
| **备注 Comment** | pBluescript SK(-) serves as a phage particle vector for gene cloning, sequencing, and in vitro transcription, validating vector functionality and cloning efficiency. |

## 质粒图谱



## 复溶方法

1. Centrifuge at 5,000×g for 5 min.
2. Carefully open the tube and add sterile water to dissolve the DNA: add 20 µl for 5 µg plasmid, and 100 µl for 100 µg plasmid.
3. Close the tube and incubate for 10 minutes at room temperature.
4. Briefly vortex the tube and then do a quick spin to concentrate the liquid at the bottom. Speed is less than 5000×g.
5. Store the plasmid at -20 ℃.