# pcDNA-dCas9-VP64

| | |
|---|---|
| **载体编号 Vector ID** | V012281 |
| **抗性 Antibiotic Resistance** | Ampicillin |
| **长度 Length** | 9812 bp |
| **载体类型 Vector Type** | CRISPR Plasmids |

## 产品信息

| | |
|---|---|
| **复制子 Replication Origin** | ori |
| **来源 Source/Author** | Perez-Pinera P, Kocak DD, Vockley CM, Adler AF, Kabadi AM, Polstein |
| **筛选标记 Selection Marker** | Neomycin/G418(Geneticin) |
| **拷贝数 Copy Number** | High copy number |
| **备注 Comment** | Expresses inactivated S. pyogenes dCas9 (D10A, H840A) fused to VP64 transactivator domain in mammalian cells |

## 质粒图谱



## 复溶方法

1. Centrifuge at 5,000×g for 5 min.
2. Carefully open the tube and add sterile water to dissolve the DNA: add 20 µl for 5 µg plasmid, and 100 µl for 100 µg plasmid.
3. Close the tube and incubate for 10 minutes at room temperature.
4. Briefly vortex the tube and then do a quick spin to concentrate the liquid at the bottom. Speed is less than 5000×g.
5. Store the plasmid at -20 ℃.