# pLV3-TRE-attB1-MCS-attB2-Puro-rtTA

| | |
|---|---|
| **载体编号 Vector ID** | V038397 |
| **抗性 Antibiotic Resistance** | Ampicillin |
| **长度 Length** | 7716 bp |
| **载体类型 Vector Type** | Protein expression, Tetracycline inducible |
| **宿主 Host** | Mammalian cells, Lentivirus |

## 产品信息

| | |
|---|---|
| **复制子 Replication Origin** | ori |
| **筛选标记 Selection Marker** | Puro |
| **拷贝数 Copy Number** | High |
| **启动子 Promoter** | tight TRE |
| **3' 引物 3' Primer** | hPGK-R |
| **培养菌株 Growth Strain(s)** | Stbl3 |
| **培养温度 Growth Temperature** | 30℃ |
| **表达方式 Expression Method** | Tetracycline inducible |

## 质粒图谱



## 复溶方法

1. Centrifuge at 5,000×g for 5 min.
2. Carefully open the tube and add sterile water to dissolve the DNA: add 20 µl for 5 µg plasmid, and 100 µl for 100 µg plasmid.
3. Close the tube and incubate for 10 minutes at room temperature.
4. Briefly vortex the tube and then do a quick spin to concentrate the liquid at the bottom. Speed is less than 5000×g.
5. Store the plasmid at -20 ℃.